






**Δρ. Ευθυμιάδης Γ. Χριστόφορος, MSc**  
**Γενικός Χειρουργός**  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ.




**EIKONA 2 >**

Συριγγώδης πόρος 9<sup>ης</sup> ώρας  
μετά την έχυσην H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>



**EIKONA 3 >**

Αποστηματική  
κοιλότητα - συρίγγιο 9<sup>ης</sup> ώρας




**EIKONA 4 >**

Αποστηματική  
κοιλότητα - συρίγγιο 9<sup>ης</sup> ώρας

**EIKONA 5 >**

Συριγγώδης πόρος με έξω στόμιο στην 9<sup>η</sup> ώρα και έσω στόμιο στην 6<sup>η</sup> ώρα. Ο πόρος διαγράφεται μετά την έχυση από το έξω στόμιο H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>



**EIKONA 6 >**

Αποστηματική κοιλότητα - συρίγγιο 5<sup>ης</sup> ώρας.  
Διατομή του έσω σφιγκτήρα, τα άκρα του οποίου εντοπίζονται στις ώρες 3 και 9.  
Διατομή έξω σφιγκτήρα με τα άκρα του να εντοπίζονται στις ώρες 3 και 7.



## Υπερχοτομογράφος

Η υπερχοτομογραφία του πρωκτικού σωλήνα αποτελεί μία από τις κύριες απεικονιστικές μεθόδους διερεύνησης των παθήσεων του πρωκτικού σωλήνα. Η προσθήκη της τρισδιάστατης απεικόνισης μας δίνει περισσότερες πληροφορίες της ανατομίας και παθολογίας της περιοχής και μας βοηθάει στον καλύτερο σχεδιασμό της αντιμετώπισης των παθήσεών της. Σε σχέση με την MRI, το κόστος της εξέτασης είναι σαφώς χαμηλότερο, η εξέταση είναι πιο γρήγορη και καλύτερα ανεκτή από τον ασθενή, λαμβάνονται άμεσα οι απαραίτητες πληροφορίες από τον ιατρό, και οι απαντήσεις στο ερώτημα της θεραπευτικής προσέγγισης.


Ενδείξεις εφαρμογής της 3D υπερχοτομογραφίας του πρωκτικού σωλήνα, του ορθού και του παχέος εντέρου μέχρι τα 25cm αποτελούν:

1. η εντόπιση των συριγγιών και η σχέση τους με τις ανατομικές δομές της περιοχής
2. η εντόπιση των αποστημάτων της περιοχής
3. οι τραυματισμοί του πρωκτού  
(μαιευτική - ιατρογενής ρήξη σφιγκτήρων)
4. στα πλαίσια μελέτης της ακράτειας
5. όγκοι της περιοχής για σταδιοποίηση της νόσου  
(βάθος διήθησης της βλάβης, ύπαρξη λεμφαδένων μεσοορθού κλπ)







EIKONA 7 >  
Λεμφαδένας μεταστατικός



EIKONA 9 >  
T1 καρκίνος του πρωκτού



EIKONA 8 >  
T3 καρκίνος παχέος εντέρου



EIKONA 10 >  
T3 N1 καρκίνος του ορθού



Η προετοιμασία της εξέτασης απαιτεί μόνο ένεμα ή υποκλιυσμό 3 - 4 ώρες προ της εξέτασης, η δε διάρκεια της εξέτασης είναι 10 - 20 λεπτά.



## ΓΕΝΙΚΗ - ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Αδριανουπόλεως 6 | Μέγαρο «BYZANTIO» | 1<sup>ος</sup> όροφος

Τ Ιατρείου 2310 953333 | 6944 953333

F 2310 933205 | K ιατρού 6944 464885

[www.efthimiadis.gr](mailto:info@efthimiadis.gr) | e-mail: [info@efthimiadis.gr](mailto:info@efthimiadis.gr)